


Ajankohtaiskatsaus


7.5.2025

Infektiolääkäri Laura Tervo


Tays, infektioyksikkö



Hengitystievirukset, influenssa



Lähde: THL, Avohilmo 2025-05-05



Lähde: THL, Avohilmo 2025-05-05

Mykoplasmaepidemia 2024


Infektiotiedote 3/2025

Julkaistu 21.3.2025

Mykoplasmaepidemia ohittunut, mutta
influenssakausi edelleen käynnissä

Infektiolääkärit Reetta Huttunen ja Juha Rannikko

Mykoplasma




Adenovirus

- Yleinen lapsilla, mutta myös aikuiset sairastuvat
- Yli 50 serotyyppiä, jotka jaetaan 7 alaryhmään
- 2024 keväällä Suomessa oli adenovirusepidemia varuskunnissa
- Tyyppi 7(d) aiheuttaa vakavaa tautimuotoa




Norovirus




MRSA =


Metisilliinille
resistentti
Staphylococcus
aureus



MRSA-verenmyrkytykset tartuntataivoittain



Todetut uudet MRSA-tartunnat päihteiden käyttäjillä ja prosenttiosuus kaikista uusista todetuista MRSA-kantajista



2. MRSA-seulontakriteerit Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

2.1. Erikoissairaanhoito

MRSA-seulontanäytteet otetaan aikuisesta osastolle yön yli jäävästä potilaasta, jos jokin alla olevista kriteereistä täyttyy:

- Potilaalla on krooninen ihottuma tai tulehtunut tai krooninen haava (esimerkiksi säärihaavat, painehaavat)
- Huumeongelma (näytteet otetaan myös alaikäisiltä huumeiden käyttäjiltä)
- Perheenjäsen on MRSA-kantaja
- Sikojen parissa työskentelevä tai hänen perheenjäsenensä
- MRSA todettu aiemmin, mutta edellisestä seulontanäytteestä yli vuosi
- Altistunut MRSA:lle edellisellä hoitotaksolla (riskitietona Uranuksessa)
- Hoidettu ulkomaisessa sairaalassa edeltäneen vuoden aikana (seulotaan myös muut [MDR-mikrobit](#))
- Turvapaikanhakija tai pakolainen, joka on ollut Suomessa vähemmän kuin vuoden (seulotaan myös muut [MDR-mikrobit](#))
- 75 vuotta täyttänyt (Coxa: 65 vuotta täyttänyt).

Seulontanäytteitä ei oteta uudestaan osasto- tai sairaalasiirroissa saman hoitotaksan aikana. Riittää, että näytteet otetaan kerran yhden hoitotaksan aikana. Toistuvasti hoitotaksalla käyvät seulotaan kolmen kuukauden välein. Toisen hyvinvointialueen sairaalasta siirtyvä seulotaan, jos kriteerit täyttyvät.

[Etusivu / Ohjeet / Infektio-ohjeet ja tiedotteet](#)

☰ Infektio-ohjeet ja tiedotteet

Päivitetty 6.5.2025

Infektio-ohjeet ja tiedotteet



[Tietoa infektioiden torjunnasta sote-yksiköille](#)



MRSA ohjeet ammattilaisille


Päivitetty 29.4.2025 -päivitetty kevennysoidon ihonpesuaineet

Hepatiitti B-epidemia pistohuumeita käyttävillä



Tippuri yleistyy

Pirkanmaa




Pirkanmaan
hyvinvointialue

Suomessa todettujen tippuritapausten määrä, lääkeherkkyydestattujen kantojen määrä ja siprofloksasiini- ja keftriaksoniresistenssiprosentit 2018–2022.

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2220
Todetut tippuritapaukset	501	607	480	507	966
Keftriaksoni	334	302	289	302	462
	0 %	0 %	0 %	0 %	0,2 %

Tippuritapaukset vuosittain
sukupuolen mukaan 2014–2023



Lähde: Tartuntatautirekisteri, THL 2024