

احتفظ بهذا المنشور
اطلع الطبيب أو الممرضة على هذا المنشور

معلومات حول مرض السل و الفحوصات الخاصة به

لماذا أعطيناكم هذا المنشور؟

إن مرض السل مرض نادر في فنلندا. لقد تم القضاء عليه بشكل شبه نهائي نتيجة للرعاية الجيدة. لقد أتيتم من بلد يمرض به الكثيرين بمرض السل. فمن الممكن أن تكونوا مصابون بمرض السل و تنتشروا عدواه دون أن تكونوا على علم بهذا الشئ. من المهم لأجل صحتكم و صحة أقاربكم و كذا الناس الآخرين أن يتم القضاء على مرض السل و معالجته في الحين إن وجد.

نرحب في فنلندا أن نحافظ على صحة المهاجرين. و لأنكم تنوون الإقامة في فنلندا لأكثر من ثلاثة أشهر فيحق لكم إجراء أشعة على الصدر (الرئتين) مجاناً. هذه الأشعة اختيارية.
نحدد من خلال الأشعة هل يوجد دلائل لمرض السل في رئتيكم.

أشعة الصدر

عادة ما يتضح مرض السل و في أغلب الأحيان من خلال أشعة إكس. الأشعة آمنة لا خوف منها.
علي المرأة الحامل أن تخبر الممرضة عن حملها قبل إجراء الأشعة. يتم أخذ الأشعة للمرأة الحامل التي ليس لديها أعراض مرض السل أثناء شهور الحمل الأخيرة.

تؤخذ الأشعة في المراكز الطبية في المدينة التي تسكنون بها. أشعة الصدر مجانية لكم. إذا ظهر بالأشعة شيء غير عادي فستحصل بكم و نرتب لكم فحوصات إضافية (تمكيلية).

نرجو منكم تسجيل أنفسكم من أجل إجراء أشعة الصدر في أقرب وقت ممكن !

أطلعوا ممرضة المركز الطبي / أو ممرضة قسم أشعة إكس علي هذا المنشور.

بيانات المركز الطبي/ أو قسم الأشعة

ما هي أعراض مرض السل؟

أهم أعراض مرض السل هي الكحة لفترة طويلة مستمرة لأكثر من ثلاثة أسابيع، و التي يمكن أن تتحول مع مرور الوقت للكحة مصحوبة بالبلغم. يمكن مع الكحة أن يوجد رذاذ بلون مائل للأصفر أو البني أو لون الدم.
و مع تطور (تحور) المرض يمكن أن تكون هناك صعوبة في التنفس و ألام في الصدر.

من الممكن لمريض السل أن يصاب بالسخونة و أن ينقص وزنه و كذا يتعرق كثيراً أثناء الليل. ربما أيضاً تضعف شهيتة و تسوء حالته الصحية. يمكن كذلك أن تكون هناك أعراض أخرى و ذلك بحسب أي جزء في الجسم تعرض للمرض.

عادة ما يتسبب مرض السل في بطئ نمو و تطور الأطفال.

مما تفعلون إذا أحسستم أن لديكم بعض الأعراض الخاصة بالسل أو إذا ظهرت مستقبلاً؟

اتصل فوراً و دون أي تأخير بالمركز الصحي لمدينتك. إن فحوصات الطبيب في هذه الحالة أمر مهم للغاية.
فحوصات الطبيب مجانية لكم. لن تصل أية بيانات أو نتائج للفحوصات إلى علم الموظفين المسؤولين عن شؤون الهجرة.

ما هو مرض السل؟

مرض السل لا ذنب لأحد فيه (أي لا يتسبب فيه أي شخص). إنه مرض معدى ينتقل من شخص لأخر. إن بكتيريا تدعى *mycobacterium tuberculosis-bakteeri* هي المسببة في هذا المرض. تظهر غالباً أعراض السل في الرئتين، حيث تكون هناك خلية (عش) يتكون فيها الإلتهاب. و من هناك يمكن للبكتيريا أن تنتشر في أجزاء أخرى من الجسم عن طريق سريانها في الدم او في سائل اللمف (سائل المناعة) فتصل مثلاً إلى العقد الليمفاوية أو إلى الأمعاء أو للجلد أو حتى لمراكيز الجهاز العصبي. من الممكن أن يوجد مرض السل في الرئتين و كذا في أجزاء أخرى من الجسم معاً في نفس الوقت.

كيف تنتقل عدو السل؟

تنقل عدو السل من شخص لأخر من خلال الهواء. عندما يتحدث الشخص المريض بسل الرئتين تنتشر بكتيريا السل في الهواء، أو عندما يغنى أو يكح أو يعطس. يمكن في هذه الأثناء أن يصاب أي شخص آخر موجود بنفس الغرفة ببكتيريا المرض في رئتيه أثناء التنفس. وفي هذه الحالة يمكن أن يصاب بالمرض كل من استمر لفترة طويلة مع المريض في نفس المكان. إن أكبر إحتمال (مخاطر) للإصابة بالمرض تكمن في أن يسكن أفراد الأسرة مع شخص من الأسرة مصاب بالمرض.

من يمكن أن يصاب بمرض السل؟

يصاب واحد فقط من كل عشرة أشخاص تعرضوا لعدو السل بهذا المرض (أي السل). و أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالمرض هم الصغار، من هم أقل من عمر خمسة أعوام، الشباب الصغير، كبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

بأي سرعة يتحول السل من مرحلة العدو إلى مرحلة المرض؟

يمكن أن ينتقل الطفل الصغير الأقل من عمر خمس سنوات من مرحلة العدو إلى مرحلة المرض بالسل خلال عدة أسابيع أو شهر من بداية إنتقال العدو و يمكن أن يتطور المرض بسرعة. أما الشخص البالغ الذي لا يوجد لديه أي أمراض عامة (شائعة) فعادة ما يظهر عليه المرض خلال عام أو عامين من بداية إنتقال العدو. إن الإصابة بالمرض يمكن أن تظهر بعد مرور عشرات السنين من العدو. لذا تذكر أعراض المرض.

أين و كيف يتم فحص الإصابة بمرض السل؟

تبدأ الفحوصات بالمركز الطبي (المستوصف)، أو بالوحدات الصحية بالمدارس (بالنسبة للطلاب) أو بمرافق الرعاية الصحية للعمال. أما الفحوصات الإضافية فتجري بالمستشفى. يتم فحص الأطفال بقسم أمراض الأطفال أو عيادة أمراض الأطفال. أما سل الرئتين للكبار يتم الفحص والعلاج بقسم أمراض الرئتين أو عيادة أمراض الرئتين.

عند الإشتباه بالإصابة بسل الرئتين تؤخذ الأشعة على الرئتين و يتم فحص عينات من الكحة (رذاذ الكحة). يتم إجراء فحص بالصبغة الملونة و فحص مزرعة على عينات الكحة. يمكن عند الحاجة إجراء اختبار سريع على عينات الكحة لبيان جينات السل.

تقضي الحاجة أحياناً إجراء ناظور (منظار) للقصبات الهوائية أو أشعة مقطعة على الرئتين. تستخدم طرق أشعة متعددة (مختلفة) عندما تجري الفحوصات على مرض السل بمكان آخر من الجسم غير الرئتين. إضافة لذلك نحاول أخذ عينة من الجزء المريض من الجسم أما من نسيجه أو سائله .

كيف تتم معالجة السل؟

يعالج السل بالأدوية. يبدأ العلاج في البداية على الأقل بأربعة أدوية. يستغرق العلاج الإعتيادي للسل نصف عام على الأقل. يمكن الشفاء من مرض السل بشكل جيد إذا ما تم اكتشافه في وقت مناسب و تم الإلتزام بمدة برنامج العلاج. إن علاج السل في فنلندا على مستوى عال (جيد) و مجاني.