

Aikuistyyppin diabeteksen seulonta sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä:

- Paastoverensokeri x1-2 (edeltävästi 8-12h paasto) ja ateriaa edeltävät mittaukset, yhteensä vähintään 4 mittausta
- B-HbA1c

Paastoverensokeri ≤ 6.0 mmol/l kaikissa mittauksissa

JA

B-HbA1c < 42 mmol/mol

JA

Ei diabeteksen riskitekijöitä



Ei viitettä diabeteksestä

Uusi arvio diabetesriskistä tulevien kontaktien yhteydessä

Paastoverensokeri 6.1–6.9 mmol/l edes yhdessä mittauksessa

TAI

$42 \leq \text{B-HbA1c} < 48$ mmol/mol

TAI

Diabeteksen riskitekijöitä



Vähintään suurentunut riski diabetekselle

Glukoosirasituskoe perusterveydenhuollossa

Ohjataan perusterveydenhuoltoon diabeteshoitajalle, kun on todettu heikentynyt glukoosinsieto tai kohonnut paastoglukoosi.

Lääkärille, jos myös $\text{BMI} \geq 35 \text{ kg/m}^2$ ja hypertensio- tai lipidilääkitys (peruskorvattavuus liraglutidille/ SVB).

Paastoverensokeri ≥ 7.0 mmol/l vähintään kahdessa mittauksessa

TAI

B-HbA1c ≥ 48 mmol/mol



Todetaan diabetes

Tehdään SVB

Aloitetaan lääkitys

Ohjataan jatkohoitoon