




Kaularankapotilaan tutkiminen

JUURI-TASO	KIPU JA TUNTOHÄIRIÖ	HEIJASTE	LIHASHEIKKOUS	EROTUSDIAGNOSTIIKASSA HUOMIOITAVAA
C5		 <i>Biceps</i>	 <i>M. deltoideus C5–(C6)</i> <i>M. supraspinatus C5–C6</i> <i>M. biceps brachii C5–C6</i>	Kipu tai lihasheikkous: Distaaliset hermovauriot (<i>n. axillaris, n. suprascapularis, n. musculocutaneus</i>) Olkanivelen ja kiertäjäkalvosimen sairaudet Tuntohäiriö: <i>n. axillaris</i> 
C6		 <i>Biceps</i> <i>Brachioradialis</i>	 <i>M. brachioradialis (C5)–C6</i> <i>M. extensor carpi radialis C6–C7</i>	Kipu tai lihasheikkous: Distaaliset hermovauriot (<i>n. radialis</i>) Kynärpään sairaudet Tuntohäiriö: <i>n. medianus</i> 
C7		 <i>Triceps</i>	 <i>M. triceps brachii C6–C7</i> <i>M. flexor carpi radialis C6–C7</i>	Kipu tai lihasheikkous: Distaaliset hermovauriot (<i>n. radialis, n. medianus</i>) Kynärpään ja ranteen sairaudet Tuntohäiriö: <i>n. medianus</i>
C8			 <i>Mm. interossei dorsales C8–Th1</i> <i>M. abductor digiti minimi C8–Th1</i> <i>M. extensor pollicis longus et brevis (C7)–C8</i>	Kipu tai lihasheikkous: Distaaliset hermovauriot (<i>n. medianus, n. ulnaris</i>) Ranteen ja käden sairaudet Tuntohäiriö: <i>n. ulnaris</i> 

Kuva 1. C5–C8-hermojuurten motorisen ja sensorisen toiminnan arviointi. Lähde: Arokoski ym. 2014